



MITRA SEJATI PARA PETANI!

FOLIRFOS[®] 400 SL



Penyakit hawar pelepah
(*Rhizoctonia solani*)



Penyakit busuk daun
(*Phytophthora infestans*)



Penyakit embun bulu
(*Peronospora destructor*)

Untuk "IMUNISASI" Tanaman

FOLIRFOS 400 SL memiliki keistimewaan khusus yang sangat berguna untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. FOLIRFOS 400 SL dengan kandungan bahan aktif asam fosfit 400 g/l yang dinetralkan suatu senyawa anorganik yang dikembangkan menjadi fungisida berdasarkan penelitian para ahli penyakit tanaman dan ahli bidang lainnya.



FOLIRFOS[®] 400 SL

KEUNGGULAN FOLIRFOS 400 SL :

- Mudah diserap dan disebarluaskan ke seluruh jaringan tanaman melalui pembuluh xilem maupun floem.
- Daya kerja ganda, kuratif & preventif.
- Efektif mengendalikan berbagai cendawan patogen pada tanaman.
- Merangsang tanaman memproduksi lebih banyak zat phytoalexin yang bersifat racun terhadap cendawan patogen penyebab penyakit tanaman.
- Daya larut sempurna sehingga efektif diserap oleh tanaman, baik dengan cara penyemprotan biasa, penyuntikan pada batang tanaman, maupun infus melalui akar.

PETUNJUK PENGGUNAAN YANG TERDAFTAR

Tanaman dan Penyakit Sasaran	Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Bawang merah Penyakit embun bulu <i>Peronospora destructor</i>	4,5 ml/l	Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan pertama dilakukan 2 minggu setelah tanam dan diulang dengan interval 5 hari.
Cengkeh Penyakit hawar daun <i>Phytophthora sp.</i>	6 ml/l	Penyemprotan volume tinggi. Aplikasi dilakukan pada pembibitan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 2 minggu.
Kakao (TM) Penyakit busuk buah <i>Phytophthora palmivora</i>	20 ml/20 ml air/pohon	Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan dilakukan pada saat terlihat adanya gejala serangan penyakit dan diulang dengan interval 5 hari.
Nenas Penyakit busuk hati <i>Phytophthora spp.</i>	2,25 ml/l	Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan pertama dilakukan satu bulan sesudah tanam dan diulang 3 bulan kemudian apabila diperlukan.
Padi Penyakit hawar pelepah <i>Rhizoctonia solani</i>	6 ml/l	Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan pertama dilakukan dipersemaian dilanjutkan dilapangan sejak umur 30 hst sampai dengan 75 hst.
Tomat Penyakit busuk daun <i>Phytophthora infestans</i>	2 ml/l	Penyemprotan volume tinggi. Penyemprotan daun mulai tanaman berumur 2 minggu dan diulang tiap 7 hari. Jangan menyemprot 7 hari sebelum panen.

Nomor Pendaftaran

: RI. 0102011990959

Pemegang Nomor Pendaftaran : PT. MITRA KREASIDHARMA



BAHAN BERTASI



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

Distributor Utama:

PT. MITRA KREASIDHARMA

Plaza Sentral Lt. 5B, Jl. Jend. Sudirman No. 47,
Jakarta Selatan 12930, Telp. (021) 57905245